


Sortie orchidées

Soucirac- mai 2009



Nous étions 10 ce jour là, dans le Lot. Avec Christian, nous avons découvert quelques fleurs et surtout de nombreuses orchidées.

Commençons par les fleurs observées :



Narcisse des poètes
(*Narcissus poeticus*)
Liliaceae



Cardoncelle mole
(*cardoncellus milissimus*)
Asteraceae



Sauge des prés
(*salvia pretensis*)
Lamiaceae



Torilis arvensis

		
Lys	Méllite à fleur de mélisse (<i>Mellitis melissophyllum</i>) Lamiaceae	Dompte venin (<i>Vincetoxicum hircundinaria</i>) Asclepiadaceae

		
Polygale commune (<i>Polygala vulgaris</i>) polygalaceae	Ancolie commune (<i>Aquilegia vulgaris</i>) Renonculaceae	Langue de serpent (<i>Ophioglossum vulgatum</i>) ophioglossaceae

Autres fleurs: Muscaris à toupet, Ancolies, glaïeul italicus, grémil, genêt des teinturiers, pigamon....

Nous avons exploré des paysages divers : sous bois, prairies humides, causses... Chaque lieu a sa flore particulière.

Nous étions venus pour observer les orchidées, nous pouvons dire que nous avons été gâtés, voici celles que nous avons pu admirer :



**Orchis homme pendu
(Acera anthropophorum)
Orchidaceae**



Orchis militaris



**Platanthère a feuilles vertes
Platanthera chlorantha**



**Orchis pyramidale
Anacamptis pyramidalis**



Listéra ovata



**Ophrys araignée
(aranifera) . Sphégodés**



**Orchis pourpre
(Orchis purpurea)**



**Orchis mâle
(Orchis mascula)**



**Orchis lâche
(Anacamptis laxiflora)**



Orchis singe
(*Orchis simia*)



Ophrys bécasse
(*Ophrys scolopax*)



Orchis brûlé
(*neotina ustulata*)



Ophrys mouche
(*Ophrys insectifera*)



Epipactis



Epictatis microphylla



**Ophrys sulcata
(labelle sillonné)**



Dactylorisa incarnata



Céphalanthère damasonium



**Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum)**



**Néottie nid d'oiseau
(Neottia nidus avis)**



Céphalanthère rubra



Hybride militaris-purpuréa

Plus en détail....

		
Limodorum	néottie	listère à feuille ovales (listera ovata)

		
bécasse	militaris	simia

		
sphégodes	Autre bécasse	

Quelques différences pointues :

	
Plathantère anthères non parallèles (chlorantha)	Plathantère anthères parallèles (bifolia)

Nous avons aussi observé quelques petites bêtes :



Escargot de Bourgogne
(*Helix pomatia*)



De pseudo-papillons (Ascalaphes communs)
nous ont suivi un moment



(*Libelluloides longicornis*)



Côté papillons :



L'azuré commun
(*Polymmatius icarus*)

Le flambé
(*Iphiclides podalirius*)



un machaon
(*Papilio machaon*)



Les autres :

Pentatome rayé
Punaise arlequin (*Graphosoma lineatum*)



La cétoine dorée (*Cétonia aurata*)




Une lepture rouge
(*Corymbia rubra*)




Monsieur et Madame grillon champêtre (*gryllus campestris*)


Une belle chenille de Moro sphinx
(*Macroglossum stellatorum*)



Ce fut une belle journée d'observation









dans la zone sommitale : pilosité vers le sommet et les s, brune à brun-rouge ou rougâtre ; bordure jaune et étroite, parsemée large ; **lunules** s, bleu violacé ou roses, **larges, s'étendant** ; sommet du médian souvent surélevé ; rapport aux latéraux **raison tardive** de fin juin (à partir de mars).



Parabou (Aude) - 5 mai 1989 (x 3)

Graphique : France et Italie répartition : Alpes à Bretagne, isolée dans le nord, Corse strictement pyrénéen.

Absent des Alpes et de l'agré-

Observations : cette plante bien caractérisée par la forme de ses fleurs, le fort sillon longitudinal de la corolle, les larges lunules, et la bordure jaune. Elle est plutôt méditerranéo-atlantique absent de la zone méditerranéenne, et préférant des stations assez élevées. Valablement décrit par BAKAYEV, 1986 sous le nom de sous-espèce *minima*, le taxon a été élevé au rang d'espèce et dédoublé par la suite (J. & P. DUBOIS, 1994). Les formes de Corse ont été nommées sous le nom d' *O. zonata*, qui sera synonyme.

